

**ANNEXE Ie - Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage**

(Volume moyen de production d'effluents par période de six mois)

	CAILLEBOTIS ET GRILLES	STABULATION ENTRAVEE		STABULATION SEMI-PAILLEE	
	Lisier	Fumier	Purin	Fumier	Lisier
	m <sup>3</sup> /animal/6 mois				
Bovin de moins de 6 mois	1.9 *	2.5	0.4	1.2	1.4
Taurillon de 6 à 12 mois	3,7	3,5	0,5	2	1,9
Taurillon de 1 à 2 ans	5,6	6	0,9	2,8	3
Génisse de 6 à 12 mois	3,7	3,5	0,5	2	1,9
Génisse de 1 à 2 ans	5,6	5	0,7	3	2,7
Vache allaitante et son veau **	7,8	7	1,1	6	3,9
Vache laitière	10	8,5	1,3	5,4	4,9
Vache de réforme	6,7	6	0,9	3,6	3,2
Autre bovin de plus de 2 ans	6,7	6	0,9	3,6	3,2

	STABULATION PAILLEE	STABULATION PAILLEE AVEC RACLAGE ***		
	Fumier	Fumier	Fumier mou	Purin
	m <sup>3</sup> /animal/6 mois			
Bovin de moins de 6 mois	1.6	1.2	1.4	0.3
Taurillon de 6 à 12 mois	4	2	1,9	0,4
Taurillon de 1 à 2 ans	5,8	3	3	0,7
Génisse de 6 à 12 mois	4	2	1,9	0,4
Génisse de 1 à 2 ans	5,8	3	2,7	0,6
Vache allaitante et son veau **	8,6	6	3,5	0,8
Vache laitière	11,7	5,4	4,8	1,1
Vache de réforme	7	3,6	3,2	0,7
Autre bovin de plus de 2 ans	7	3,6	3,2	0,7

\* Dans le cas des veaux de boucheries, il s'agit d'une norme par place et non pas pour 6 mois.

\*\* Valeur pour la mère et son veau. Si le veau n'est pas hébergé avec la mère, prendre la valeur de la vache de réforme pour la mère. Le veau est alors comptabilisé dans la catégorie « veau de moins de 6 mois », éventuellement dans un autre type d'hébergement.

\*\*\* La stabulation avec raclage est une stabulation qui engendre une production de fumiers mous en cas de raclages fréquents. Les volumes de purin mentionnés résultent de la séparation des phases du fumier mou produit. Dans le cas où la fréquence réduite du raclage de la stabulation entraîne la production d'un fumier de plus de 15 % de matière sèche, ce fumier peut être stocké sur fumière et ne nécessite pas de stockage de purin autre que les jus d'écoulement de la fumière.

	CAILLEBOTIS	STABULATION PAILLEE AVEC RECOLTE DES URINES		STABULATION ENTIEREMENT PAILLEE
	Lisier	Fumier	Purin	Fumier
	m <sup>3</sup> /place/6 mois			
Porcelet (de 4 à 10 semaines)	0,20	0,27	0,1	0,28
Truie gestante	2,4	0,75	0,75	2,7
Truie avec porcelets	3,6	1,8	1	4,6
Verrat	2,5	0,75	0,75	2,7
Porc à l'engrais	0,6	0,37	0,27	0,66

	GRILLES	SUR LITIERE
	Lisier ou fientes	Fumier
	m <sup>3</sup> /1000 animaux/6 mois	
Poules reproductrices et poulettes	22,5	22,5
Poules pondeuses	34,5	27,0
Poulets de chair	21,0	15,0
Pintades		37,5
Oies		60,0
Canards	27,0	60,0
Dindes et dindons	45,0	66,0
	m <sup>3</sup> /animal/6 mois	
Lapins (100 mères)	22,5	
Ovin et caprin de moins d'1 an		0,4
De plus d'1 an		0,9
Equin		6,1

Cette annexe Ire a été remplacée par l'AGW du 23 septembre 2004, art. 1<sup>er</sup>.