

Annexe XXVI

Tableau de la production annuelle d'azote par catégorie animale après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte tenu des périodes de vide sanitaire pour les porcins et les volailles

| Types d'animaux | |
|---|---------------|
| | kg N/tête.an |
| Vache laitière | 90 |
| Vache allaitante | 73 |
| Vache de réforme | 73 |
| Autre bovin de plus de 2 ans | 73 |
| Bovin de moins de 6 mois | 10 |
| Génisse de 6 à 12 mois | 23 |
| Génisse de 1 à 2 ans | 44 |
| Taurillon de 6 à 12 mois | 28 |
| Taurillon de 1 à 2 ans | 53 |
| Ovin et caprin de moins d'1 an | 3,3 |
| Ovin et caprin de plus d'1 an | 6,6 |
| Equin | 56 |
| | |
| | kg N/place.an |
| Truie et truie gestante | 15 |
| Verrat | 15 |
| Porc à l'engrais et cochette | 7,8 |
| Porc à l'engrais et cochette sur litière biomaitrisée | 4,5 |
| Porcelet (de 4 à 10 semaines) | 1,9 |
| Poulet de chair (40 jours) | 0,27 |
| Poule pondeuse ou reproductrice (343 jours) | 0,62 |
| Poulette (127 jours) | 0,27 |
| Coq de reproduction | 0,43 |
| Canard (75 jours) | 0,43 |
| Oie (150 jours) | 0,43 |
| Dinde, dindon (85 jours) | 0,81 |
| Pintade (79 jours) | 0,27 |
| Lapin mère | 3,6 |
| Autruche et émeu | 3 |
| Caille | 0,04 |